


MMA/PA Anamix Infant

Modersmjölksersättning för kostbehandling av metylmalonsyraemi (MMA) och propionsyraemi (PA) med LCP och spädbarnets kostfiber GOS/FOS



MMA/PA Anamix Infant

MMA/PA Anamix Infant är en modersmjölksersättning utan metionin, treonin, valin och lågt innehåll av isoleucin, avsedd för kostbehandling av metylmalonsyraemi (MMA) och propionsyraemi (PA) hos spädbarn 0–1 år. Innehåller essentiella och icke essentiella aminosyror, kolhydrat, fett, vitaminer, mineraler och spårämnen. Den är kompletterad med LCP (långkedjiga fettsyror), arakidonsyra (ARA) och dokosaheksaensyra (DHA) i nivåer som motsvarar bröstmjölkens. Dessutom innehåller MMA/PA Anamix Infant en unik kostfiberblandning av GOS/FOS (galakto- och fruktooligosackarider).

MMA/PA Anamix Infant måste kompletteras med naturligt protein, t.ex. från bröstmjolk, för att täcka behovet av metionin, treonin, valin och isoleucin enligt ordination från dietist eller läkare.

MMA/PA Anamix Infant per 100 ml vid en spädning på 15 g/100 ml

- 70 kcal
- 3,5 g fett från solros-, soja-, kokos-, raps- och encellsolja med hög halt av ARA och DHA (44 E%)
- 7,5 g kolhydrat från glukossirap (43 E%)
- 0,56 g kostfiber från galakto- och fruktooligosackarider GOS/FOS (2 E%)
- 2 g proteinekvalenter (11 E%)

ANVÄNDNING

MMA/PA Anamix Infant är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och används under inrådan av dietist eller läkare som modersmjölksersättning i kostbehandlingen av metylmalonsyraemi och propionsyraemi hos spädbarn 0–1 år. Lämplig som komplement till barnets övriga kost från 1–3 år.

DOSERING

Doseringen är individuell och görs i samråd med dietist eller läkare.

TILLREDNING

Spädning: Det rekommenderas att använda skopan som finns med i burken för rätt dosering. För varje skopa (5 g) tillsätts 30 ml vatten för att uppnå rekommenderad koncentration (15%). Initialt kan en lägre koncentration krävas för att säkerställa fullgod acceptans. Modersmjölksersättning i pulverform är inte steril. MMA/PA Anamix Infant skall därför tillredas strax innan matningstillfället och inte varmhållas längre än 15 minuter innan näringen serveras. Överbliven näring kastas.

1. För att undvika kontamination, tvätta händerna och använd alltid väl rengjorda hushållsredskap.
2. Koka upp vatten (använd aldrig varmt vatten direkt från kranen). När det gäller äldre barn behöver vattnet som regel inte kokas om vattenkvaliteten är god, men pulvret löser sig bäst i varmt vatten.
3. Låt vattnet svalna några minuter och mät upp avsedd mängd vatten i en nappflaska/behållare.
4. Tillsätt rekommenderat antal skopor pulver till vattnet.
5. Vispa eller skaka kraftigt tills pulvret löst sig.
6. Kontrollera blandningens temperatur genom att droppa MMA/PA Anamix Infant på insidan av din handled.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Öppnad burk lagras torr, ej över normal rumstemperatur. Bäst-före datum anges på burkens botten som dag-månad-år. Öppnad burk försluts väl och förbrukas inom två veckor.

INGREDIENSER

Torkad glukossirap, raffinerat vegetabiliskt fett (solrosolja med hög andel oljesyra, soja-, icke hydrerad kokos-, raps- och solrosolja), kostfiberblandning (galaktooligosackarider (GOS), (från mjölk), fruktooligosackarider (FOS)), L-lysin-L-glutamat, L-leucin, laktos (från mjölk), L-alanin, glukos (från mjölk), L-arginin, L-asparaginsyra, kalciumfosfat tribasisk, emulgeringsmedel (E472c), L-histidin, L-fenylalanin, L-tyrosin, L-serin, glycin, L-prolin, kaliumklorid, trikaliumcitrat, L-cystin, L-tryptofan, dinatriumvätefosfat, magnesiumacetat, encellsolja med hög andel arakidonsyra, kolinbitartrat, encellsolja med hög andel dokosaheksaensyra, L-glutamin, natriumklorid, M-inositol, L-askorbinsyra, L-glutaminsyra, galaktos (från mjölk), taurin, järnsulfat, zinksulfat, L-karnitin, DL- α -tokoferylacetat, kalcium-D-pantotenat, nikotinamid, antioxidanter (E304, E306, E307), mangansulfat, kopparsulfat, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, vitamin A-acetat, kaliumjodid, kromklorid, folsyra, vitamin K₁, natriumselenit, natriummolybdat, D-biotin, vitamin D₃, cyanokobalamin.

Nutricias produkter är livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under inrådan av dietist eller läkare.

Nutricia. Tel: 08-24 15 30. www.nutricia.se

| Näringsvärde | | per 100 g | Per 100 ml 15% spädning |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Energi | | Kcal 466 | 70 |
| | | kJ 1950 | 293 |
| Fett (44 E%) | | g | 23,0 |
| varav | | | 3,5 |
| – mättat | g | 7,5 | 1,1 |
| – enkelomättat | g | 9,4 | 1,4 |
| – fleromättat | g | 5,0 | 0,75 |
| varav | | | |
| – linolsyra (LA) | g | 4,1 | 0,62 |
| – α -linolensyra (ALA) | g | 0,66 | 0,1 |
| – arakidonsyra (ARA) | mg | 140 | 20 |
| – docosaheksaensyra (DHA) | mg | 70 | 10 |
| Förhållandet n6:n3 | | 5,9:1 | |
| Kolhydrat (43 E%) | | g | 49,8 |
| varav sockerarter | g | 7,3 | 1,1 |
| Kostfiber (2 E%) | | g | 3,7 |
| – lösliga | g | 3,7 | 0,56 |
| – olösliga | g | – | – |
| Proteinekvalenter (11 E%) | | g | 13,1 |
| Salt | | g | 0,5 |
| Aminosyror | | g | 15,5 |
| L-alanin | mg | 1,6 | 0,24 |
| L-arginin | mg | 1,4 | 0,21 |
| L-asparaginsyra | mg | 1,27 | 0,19 |
| L-cystine | mg | 0,51 | 0,08 |
| L-glutamin | mg | 0,11 | 0,02 |
| L-glutaminsyra | mg | 1,59 | 0,24 |
| Glycin | mg | 0,64 | 0,1 |
| L-histidin | mg | 0,94 | 0,14 |
| L-isoleucin | mg | <0,045 | <0,007 |
| L-leucin | mg | 2,12 | 0,32 |
| L-lysin | mg | 1,43 | 0,22 |
| L-metionin | mg | ej tillsatt | ej tillsatt |
| L-fenylalanin | mg | 0,93 | 0,14 |
| L-prolin | mg | 0,64 | 0,1 |
| L-serin | mg | 0,89 | 0,13 |
| L-treonin | mg | ej tillsatt | ej tillsatt |
| L-tryptofan | mg | 0,41 | 0,06 |
| L-tyrosin | mg | 0,93 | 0,14 |
| L-valin | mg | ej tillsatt | ej tillsatt |
| Mineraler | | | |
| Natrium | mg (mmol) | 191 (8,3) | 28,7 (1,2) |
| Kalium | mg (mmol) | 501 (12,8) | 75,2 (1,9) |
| Klorid | mg (mmol) | 355 (10,1) | 53,3 (1,5) |
| Kalcium | mg (mmol) | 410 (10,2) | 61,5 (1,5) |
| Fosfor | mg (PO ₄ mmol) | 300 (9,7) | 45 (1,5) |
| Magnesium | mg (mmol) | 58 (2,4) | 8,7 (0,36) |
| Järn | mg | 8,1 | 1,2 |
| Zink | mg | 5,7 | 0,86 |
| Koppar | mg | 0,43 | 0,06 |
| Mangan | mg | 0,43 | 0,06 |
| Molybden | μ g | 12 | 1,8 |
| Selen | μ g | 15,5 | 2,3 |
| Krom | μ g | 13,8 | 2,1 |
| Jod | μ g | 83 | 12,5 |
| Vitaminer | | | |
| Vitamin A | μ g-RE | 392 | 58,8 |
| Vitamin D ₃ | μ g | 8,7 | 1,3 |
| Vitamin E | mg α -TE | 4,6 | 0,69 |
| Vitamin C | mg | 49 | 7,4 |
| Vitamin K ₁ | μ g | 37,2 | 5,6 |
| Tiamin | mg | 0,5 | 0,08 |
| Riboflavin | mg | 0,5 | 0,08 |
| Niacin | mg-NE | 9,0 | 1,4 |
| Pantotensyra | mg | 2,8 | 0,42 |
| Vitamin B ₆ | mg | 0,5 | 0,08 |
| Folsyra | μ g | 55 | 8,3 |
| Vitamin B ₁₂ | μ g | 1,2 | 0,18 |
| Biotin | μ g | 18,2 | 2,7 |
| Övriga näringsämnen | | | |
| Karnitin | mg | 10 | 1,5 |
| Kolin | mg | 91 | 13,7 |
| Inositol | mg | 98 | 14,7 |
| Taurin | mg | 30 | 4,5 |
| Osmolalitet | mOsmol/kg H ₂ O | | 380 |

MMA/PA Anamix Infant kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order.amnse@nutricia.com telefon: 08-24 15 30 eller fax 019-76 62 330.

MMA/PA Anamix Infant Bestnr: 77 78 13 Förpackning: 1 burk à 400 g

En burk ger 2,6 l lösning vid en 15% spädning

